

ГРУДОПОЯСНИЧНЫЕ КОРСЕТЫ



ЛЕГКАЯ степень фиксации

ПОКАЗАНИЯ:

- профилактика искривления осанки
- начальные, умеренные формы сколиотической деформации позвоночника

РЕЗУЛЬТАТ применения:

- улучшение осанки, не ограничивая свободы движений
- умеренная реклинация и разгрузка верхне- и среднегрудного отделов с сохранением тонуса мышц

СРЕДНЯЯ степень фиксации

ПОКАЗАНИЯ:

- формирование правильной осанки у детей и взрослых, сколиозы, кифосколиозы, крыловидные лопатки
- остеохондроз грудного отдела позвоночника, спондилопатии легкой степени
- период реабилитации после травм и операций грудного отдела позвоночника, акромиально-ключичного сочленения
- частичные повреждения связок акромиально-ключичного сочленения, радикулопатии грудного отдела

РЕЗУЛЬТАТ применения:

- улучшение осанки, не ограничивая свободы движений
- реклинация и разгрузка верхне- и среднегрудного отделов с укреплением мышечного корсета тонуса мышц

СИЛЬНАЯ степень фиксации

ПОКАЗАНИЯ:

- поддержка позвоночника при устойчивых формах сколиотических деформаций II-III степени
- переломы грудного отдела позвоночника, остеопороз, межпозвонковые грыжи грудного отдела позвоночника, кифосколиозы

РЕЗУЛЬТАТ применения:

- реклинация и разгрузка позвоночника с улучшением поддерживающего мышечного корсета

МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- применение, сроки ношения, особенности использования серийных ортезов определяет лечащий врач

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРОКАМ НОШЕНИЯ:

- 2-4 часа в день. Сочетать с комплексами ЛФК, ФТЛ. Использование корректоров осанки для постоянного ношения согласовывать с лечащим врачом