

РЕТИНОВЕЫЙ ПИЛИНГ NATURE ANSSE

Ретиноевый или желтый пилинг плотной гелевой формы, в основе которого используется ретинол искусственного происхождения. Обеспечивает выраженное омоложение кожи, выравнивает ее рельеф, устраняет гиперпигментацию, обогащает ткани витаминами и антиоксидантами. Лимонная и молочная кислоты активизируют действие ретиноидов, снижают риск возникновения постпроцедурной пигментации. Отличается быстрым периодом восстановления.

Механизм действия: ретиноиды (искусственные аналоги витамина А) обеспечивают регулировку процессов дифференцировки, пролиферации и межклеточных взаимодействий. Попадая в клетку, они образуют связь с ядерными сенсорами, что приводит к активизации или замедлению функционирования определенных участков генома клетки. В результате чего ретиноиды повышают уровень митотической активности базальных кератиноцитов, нормализуют процессы дифференцировки и кератинизации в эпидермисе, стимулируют синтез эпидермальных липидов, активизируют синтез компонентов межклеточного матрикса дермы, нормализуют синтез меланина, уменьшают количество атипичных клеток. Воздействие ретиноидов на кожу во время процедуры пилинга не приводит к повреждениям кожного покрова, разрушению живых клеток и коагуляции протеинов. Поэтому процедура желтого пилинга отличается минимальным повреждением кожи, непродолжительностью периода реабилитации и имеет низкую вероятность осложнений.

Состав пилинга: ретиноевая кислота, молочная кислота, лимонная кислота, ксантановая камедь, гелевый наполнитель, натрия пирролидонкарбоксилат.

Упаковка: 8 флаконов x 3 мл

Расход: 1 флакон (3 мл) на 1 процедуру

Показания для проведения процедуры:

1. Профилактика возрастных изменений;
2. Мелкие и средние морщины;
3. Потеря эластичности кожи;
4. Повышенная пигментация;
5. Акне и постакне;
6. Себорейный дерматит;
7. Гиперкератоз;
8. Розацеа;
9. Кератомы;
10. Фотостарение;
11. Сглаживание рубцов на лице и теле;
12. Подготовка к дерматопластике;

Противопоказания:

1. Повышенная чувствительность к компонентам материала;
2. Прием ретиноидов;
3. Инфекционные заболевания кожи;
4. Герпес в стадии обострения;
5. Нарушение целостности кожных покровов;
6. Хронические дерматозы в стадии обострения;
7. Избыточная инсоляция;
8. Беременность и лактация;
9. Склонность к гипепигментации;
10. Планирование беременности, беременность и лактация;
11. Гепатиты, цирроз и другие болезни печени;

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

Общая продолжительность: 30 минут.

1 этап – Предпилингвая подготовка кожи:

- Проводится пациентом самостоятельно в домашних условиях. Включает в себя использование предпилингвого ухода NATURE ANSSE Silver или Gold Peelcomplex. При нормальном типе кожи назначается не менее чем за 2-3 недели до проведения процедуры. Для пациентов со смуглой и чувствительной кожей - не менее чем за 4-5 недель. На это время клиенту не рекомендуется применять скрабы и другие отшелушивающие косметические составы, а также необходимо воздержаться от посещения солярия, и других лучевых процедур.

Максимальный эффект достигается при включении в средства домашнего ухода препаратов, содержащих в своем составе ретиноиды (0,025 – 0,1% третиноина). Дополнительно: рекомендовано назначить средства, обладающие ингибирующим действием на тирозиназу, что минимизирует риск образования поствоспалительной гиперпигментации. А также применять перорально гепатопротекторы (метионин, адеметионин, тиоктовая кислота, фосфолипиды, орнитин) до и во время проведения курса ретиноевого пилинга.

2 этап – Проведение процедуры пилинга (процедура проводится во второй половине дня):

- Демакияж и очищение кожи;
- Обезжиривание кожи предпилингвым лосьоном с содержанием гликолевой и салициловой кислоты, возможно нанесение 1-2 слоя пилинга Джесснера на 10-15 минут без нейтрализации перед использованием желтого;
- Нанесение от 1-3 слоев желтого пилинга на кожу лица, необходимо активно втирать в кожу в течение 10-15 минут.

Расход: 1 флакон (3 мл) на 1 процедуру. Выполняется с помощью плотной кисти от периферии к центру в последовательности: лоб, виски, щеки, нос, подбородок, шея. Во время нанесения возможно ощущение жжение.

Время экспозиции – от 4-12 часов в зависимости от типа кожи пациента, а так же от желаемой интенсивности процессов стимуляции. Смывается водой пациентом самостоятельно в домашних условиях.

Возможно появление эритемы и незначительной отечности в области проведения процедуры, которая сохраняется в течение 2-5 суток. Через 12-48 часов после пилинга в зависимости от степени интенсивности пилинга возможно шелушение. В связи с тем, что ретиноиды проникают в сосочковый слой дермы и, попадая в кровоток, оказывают системное действие, эксфолиация может наблюдаться даже на тех участках, где пилинг не проводился. Данные явления ожидаемы и не являются симптомами аллергической реакции. Очень важно проинформировать об этом пациента во время консультации.

На 2-3 сутки после проведения процедуры пациента может беспокоить зуд, как индивидуальная реакция организма на ретиноиды. Со второго дня после процедуры и до полного восстановления кожи необходим уход, направленный на предотвращение обезвоживания, защиту от повреждений ультрафиолетом, от инфицирования, а также на активизацию процессов регенерации и восстановления.

Курс: 1-2 процедуры с интервалом в 4-6 недель 1-2 раза в год, желателно в осеннее-зимний период.

Изготовитель, организация, принимающая претензии:

ООО «ЭМДЖИКО», 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Барочная д.4 литер Ж помещение 2Н / natureansse.ru, arilis.ru, info@arilis.ru, 8 800 555 42 09 *Натур Анссе

Хранить в сухом, недоступном для детей месте; от +4 до +25 °С

Не для приема внутрь. Не является медицинским изделием.

Не является лекарственным средством.

Срок годности 4года

Nature Ansse
composants d'origine France

